

Изучение Реакции Алкилирования 2-Тиоксо-6-Фенилпиримидин-4-Она С Высшимиалкилгалогенидами

1. Х. И. Нурбаев
2. Н. К. Мургазаева

Received 19th Feb 2022,
Accepted 18th Mar 2022,
Online 22th Apr 2022


^{1,2} Самаркандский государственный
медицинский университет Самарканд,
Узбекистан

Аннотация: Проведено алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидин – 4 - она с высшимиалкилгалогенидами. Показано, что в зависимости от условий реакции и соотношения реагентов образуются продукты N3-алкилирования. Найдено, что в отличие от метилиодида и метилтозилата алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она с высшимиалкилгалогенидами в абсолютном спирте идёт с образованием смеси изомерных N3 и O4-алкилпродуктов.

Ключевые слова: пиримидинон, алкилирования, фенил, тиоксо, тозилат, продукт, спектр, триплет.

Реакция алкилирования 2-тиоксопиримидинов-4 как и в случае их 2-оксоаналогов идёт в разных направлениях. Имеется также различие в направлении реакции между этими двумя системами. Это обусловлено различной электроотрицательностью атомов кислорода и серы, хотя анионы 2-тиоксо-6-метил(фенил)пиримидинов-4 аналогично

2-тиоксо-6-метилпиримидиону-4 имеют полидентный характер, отрицательный заряд в которых делокализован от атома кислорода в сторону других гетероатомов [1].





Существование анионов 2-тиоксо-6-метилпиримидинона-4 в указанных выше формах было подтверждено сравнительным изучением ИК-спектров нейтральной молекулы и его натриевой соли, где в случае соли полоса поглощения карбонильной группы при 1680см^{-1} исчезает, что указывает на координацию металла с атомом кислорода [2].

При метилировании же 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 иодистым метилом и метилтозилатом в ДМФА алкилирующий агент направляется кроме S-центра и по атому азота в положении 3. Алкилирование атома кислорода 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 наблюдалось и при метилировании метилтозилатом в ДМФА.

Вместе с этим 2-тиоксо-6-метил- и фенилпиримидиноны-4 уже отмечалось ведут себя по-разному в реакциях метилирования. В связи с вышеизложенным мы провели алкилирование 2-тиоксо-6-метил(фенил)пиримидинонов-4 алкилгалогенидами $\text{C}_4\text{-C}_9$ в подобных для 2-тиоксо-6-метилпиримидинона-4- условиях (KOH, водный спирт, нагревание 3 часа.)

Оказалось, что реакция идёт гладко при соотношении реагентов 1:1 и даёт

2-алкилтио-6-метил-, фенилпиримидиноны-4 с хорошими выходами [3].



Выходы и некоторые физико-химические характеристики полученных соединений приведены в таблице №1

Таблица-1. Выходы и некоторые физико-химические характеристики 2-алкилтио-6-метил-, фенилпиримидин-4-онов

№	Алкилирующий агент	Продукт реакции	R ¹	Выход в %	Т.пл.°С	R _f **	Найдено в %				Брутто формула	Вычислено в %			
							C	H	N	S		C	H	N	S
1	n-C ₄ H ₉ Br	3	n-C ₄ H ₉	92	158-160	0,90	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
2	вт. C ₄ H ₉ I	4	вт. C ₄ H ₉	60	190-192	0,83	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
3	изо-C ₄ H ₉ Cl	5	изо-C ₄ H ₉	31	194-196	0,30	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
4	n-C ₅ H ₁₁ Br	6	n-C ₅ H ₁₁	92	158-160	0,78	65,5	6,56	10,2	11,5	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ OS	65,6	6,56	10,2	11,6
5	n-C ₆ H ₁₃ Br	7	n-C ₆ H ₁₃	83	142-144	0,81	66,5	6,92	9,71	11,1	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ OS	66,6	6,94	9,72	11,1
6	n-C ₇ H ₁₅ I	8	n-C ₇ H ₁₅	60	78-80	0,92	67,5	7,27	9,26	10,5	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ OS	67,5	7,28	9,27	10,5
7	n-C ₈ H ₁₇ I	9	n-C ₈ H ₁₇	70	122-124	0,69	68,2	7,58	8,86	10,0	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ OS	68,3	7,59	8,86	10,1
8	n-C ₉ H ₁₉ I	10	n-C ₉ H ₁₉	79	120-122	0,90	69,0	7,36	8,47	9,68	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ OS	69,0	7,87	8,48	9,69

*Соединения 3-10 перекристаллизовали из гексана.

**Значения R_f- определены в системе хлороформ: спирт, на пластинках SilufolUV-254

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР-, Масс-спектров. В ИК-спектре полосы поглощения карбонильной группы в области 1659-1677 cm^{-1} , полосы поглощения при 2903-3400 cm^{-1} характеризуют νNH

В спектре же 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 присутствуют полосы поглощения

νCO -группы в области 1664-1677 cm^{-1} , а валентные колебания NH-группы проявляются в области 2902-3051 cm^{-1} .


Алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 н-бутилбромидом в абсолютном спирте идёт с образованием 2-тиоксо-3-н-бутил-6-фенилпиримидинона-4.

Аналогичные данные были получены при проведении реакции в CH_3CN в присутствии гидрида натрия. В его спектре ПМР имеется сигнал протонов при 3,25 м.д. в виде триплета, характерный для N^3 -метиленовой группы. Протоны концевой метильной группы дают триплет с центром при 0,75 м.д. а протоны метиленовых групп обнаруживаются в виде двух мультиплетов в области 1,25 и 1,65 м.д. метинный протон при Н-5 проявляется в виде синглета при 6,92 м.д. и значительно сдвинут в сторону слабого поля по сравнению с таковым для 2-тиоксо-3-н-бутил-6-фенилпиримидинона-4 (6,13 м.д.).

Протоны бензольного кольца наблюдаются в области 7,40 и 8,12 м.д. (мультиплеты).

При переходе от алкилгалогенидов нормального строения к алкилгалогенидамизостроения направление реакции резко меняется. Так, алкилирование натриевой соли

2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 *вт.*-бутилиодидом как в спирте, так и в ДМФА приводит к образованию исключительно 2-тиоксо -4-*вт.*бутилокси-6-фенилпиримидину.



В спектре ПМР этого соединения характерные сигналы O-метиленовых протонов проявляются в виде мультиплета с центром при 4,02 м.д., концевая метильная группа при 0,87 м.д. (триплет), а метильные протоны *вт.*-бутильного остатка при 1,32 м.д., метиленовый протон *вт.* бутильной группы дает резонансную линию при 1,62 м.д. метинный протон при Н-5 имеет значение хим.сдвиг при 6,92 м.д. (синглет), а протоны бензольного кольца – 7,40 и 8,12 м.д.

Эти данные также подтверждают вышесказанное о роли пространственного эффекта в изученных реакциях алкилирования.

Экспериментальная часть.

Tesla BS-567 А (внутренний стандарт – ТМС, ГМДС, шкала δ). Значения R_f определены на пластинках «Silufol» UV – 254 (ЧССР). Проявитель: пары иода. Растворители (ацетонитрил, спирт, ДМФА, ДМСО) очищены и абсолютированы по методике [4].

Общая методика реакций алкилирования C₄-C₉ в различных растворителях.

В трехгорлую колбу, снабженную капельной воронкой, механической мешалкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой. Помещают 10 ммоль

2-оксо-, -тиоксо-, селеноксо-амино-, метилтиопиримидинона-4.

Вещество растворяют или суспензируют в 45 мл абс.растворителя и при перемешивании прибавляют 0,06 г (2,5 ммоль) гидриданатрия.

Перемешивают 30 мин. и в образовавшийся раствор натриевой соли соединения при перемешивании по каплям прибавляют 1 ммоль алкилирующего агента в 2 мл растворителя.

Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре 24 часа или нагревании на кипящей водяной бане 4 часа.

По окончании реакции содержимое колбы разлагают 150 мл холодной воды. Образовавшийся осадок отфильтровывают (в тех случаях когда при разложении осадок не выпадает продукт реакции извлекают хлороформом), промывают водой, сушат и определяют количество алкилпродукта методом ПМР- спектроскопии.

Синтез 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4

В двухгорлую колбу снабженную механической, обратным холодильником помещали 130 мл абс.спирта, 7,5 г (0,32 моль) металлического натрия, 82 мл бензол уксусного эфира и 24 г тиомочевины. Реакционную смесь перемешивали до образования гомогенной смеси. Потом перемешивали на водяной бане в течение 6 часов, отгоняли спирт, оставшийся остаток растворяли в воде и реакционную смесь подкисляли 50%ной уксусной кислотой до $R^H=5$. Выпавший осадок отфильтровали, промывали ацетоном и хлороформом.

Выход: 14 г (65%) $T_{пл} = 253-255^{\circ}C$ (гексан).

Получение 2-втор.-бутилтио-6-фенилпиримидинона-4

Аналогично вышеописанному из раствора с 20 мл абсолютного спирта, 0,10 г (2,5 ммоль) едкого натрия, 0,51 г (2,5 ммоль) исходного соединения, и 0,3 мл (2,5 ммоль) втор. иодистого бутила получили 0,73 г (60%) продукта с $t.пл. = 190-192^{\circ}C$ (гексан).

ИК-спектр: 1667 ($\nu=CO$), 1544 ($\nu C=C$), 1566 ($\nu C=N$)

Масс-спектр: m/z ($J_{отн}\%$): 260 (M^+ ;21), 245 (M^+-15 ;13), 132 (M^+-28 ;53), 227 (M^+-33 ;40), 204 (M^+-56 ;100), 199 (M^+-61 ;14) 176 (M^+-84 ;33), 171 (M^+-89 ;22), 146 (M^+-114 ;80),

116 (M^+-144 ;88), 103 (M^+-157 ;94).

Алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 с избытком втор. бутилиодида.

Аналогично вышеописанному из 0,10 г (2,5 ммоль) едкого натра, 0,51 г (2,5 ммоль) в исходного соединения и 1,5 мл (12,0 ммоль) втор. бутилиодида в 20 мл абсолютного ДМФА получили 0,81 г (66%) продукта с $t.пл. = 188-190^{\circ}C$ (гексан).

Масс-спектр, m/z ($J_{отн}\%$): 316 (M^+ ;30), 288 (M^+-28 ;38), 283 (M^+-33 ;28), 260 (M^+-56 ;28), 245 (M^+-71 ;30), 232 (M^+-84 ;69) 227 (M^+-89 ;48), 204 (M^+-112 ;100), 199 (M^+-117 ;19), 187 (M^+-129 ;15), 172 (M^+-114 ;56) 160 (M^+-156 ;100) 146 (M^+-170 ;26) 128 (M^+-188 ;25).

Получение 2-н-гексилтио-6-фенилпиримидинона-4

Аналогично вышеописанному из раствора с 0,14 г (2,5 ммоль) едкого калия 0,51 г

(2,5 ммоль) исходного соединения и 0,36 мл (2,5 ммоль) н-гексил бромида в 20 мл абсолютного спирта получили 0,60г (83%) продукта с т.пл.=142-144⁰С. (гексан)

ИК-спектр: 1661 (ν =CO), 1543 (ν C=C), 1566 (ν C=N).

Использованная литература:

1. Нурбаев Х.И., Ураков Б.А., Абдуллаев Н.Д., Шахидоятов Х.М. Алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она алкилгалогендами С₄-С₉. Узб.хим. журнал 2013 №2 стр.48-54.
2. Ортиков И.С., Нурбаев Х.И., Насруллаев А.О., Шахидоятов Х.М. \ \ О направлениях реакции 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она с С₄-С₉алкилгалогендами Узб.хим.журнал 2013№4 стр. 26-30.
3. Нурбаев Х.И. Алкилированиеполидентных анионов 2-оксо-, -тиоксо-, -селеноксо-, -метилтиоамино-6-метил, 2-тиоксо-6-фенилпиримидинонов-4 алкилгалогенидами С₄-С₉. Дисс.канд.хим.наук Ташкент, 1998. стр. 92-103.

